

Алгоритм работы предприятий, учреждений по вопросам иммунизации сотрудников.

1. Руководителем организации ежегодно представляется в территориальную лечебно – профилактическую организацию (по месту фактического расположения объекта) списки работающих с указанием года рождения, занимаемой должности, сведений о прививках в соответствии с п. 5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
2. Руководителем организации должны проводиться санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников в части организации иммунопрофилактики сотрудников против инфекционных заболеваний

Нормативные документы:

- 1) ст. 2, 29, 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 2) п.1 и п.3 ст.5 Федеральный Закон N 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
- 3) п.1.5; 2.1; 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:
- 4) СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней": п.18.1., 18.3., 18.8., 18.10.
- 5) СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
- 6) п.2 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. №125н "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

1. Вакцинация против дифтерии, столбняка

Контингент: Взрослые от 18 лет без ограничения возраста

Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации (должны быть данные о 2-х кратной вакцинации и ревакцинации 1 раз в 10 лет)

2. Вакцинация против гепатита В

Контингент: взрослые от 18 до 55, лет не привитые ранее и не болевшие

Трехкратная иммунизация: вторая прививка через 1 мес после первой, третья прививка через 5 мес после второй (схема 0-1мес-6мес)

3. Вакцинация против кори – 2 прививки с интервалом не менее 6 мес.

3.1. До 35 лет контингенты, не относящиеся к группам риска

3.2. До 55 лет - контингенты, относящиеся к группам риска: работники транспорта, торговли, коммунальной и социальной сферы:

- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;
- работники предприятий пищевой промышленности;
- работники организаций, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов;
- работники предприятий транспорта

- работники сферы обслуживания населения, в том числе сферы гостиничного обслуживания, торговли непродовольственными товарами, бытового обслуживания населения, клининговых компаний);

- работники коммунальной сферы, в том числе обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети; занятые в сфере коммунального благоустройства;

3.2. лица старше 18 лет без возрастных ограничений – для работников организаций, осуществляющих **медицинскую и образовательную деятельность** независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, **иностранцы граждане**, прибывшие на территорию РФ с целью осуществления трудовой деятельности - Согласно Постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской области №05-24/2 от 24.01.2014г. "О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области"

4. Вакцинация против краснухи – 2 прививки с интервалом не менее 6 мес.
Контингент: женщины до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против краснухи

5. Вакцинация против гриппа перед эпидсезоном

Контингент:

- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;

- работники предприятий пищевой промышленности;

- работники организаций, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов;

- работники предприятий транспорта

- работники сферы обслуживания населения, в том числе сферы гостиничного обслуживания, торговли непродовольственными товарами, бытового обслуживания населения, клининговых компаний);

- работники медицинских организаций;

- работники коммунальной сферы, в том числе обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети; занятые в сфере коммунального благоустройства;

Дополнительные нормативные документы:

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» п. 8.3., п.11.2.

6. Иммунизация против гепатита А (по результатам скрининга на наличие антител к гепатиту А). Лицам, не имеющим антител к гепатиту А, проводится 2-х кратная иммунизация с интервалом 6-12 мес.:

- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;

- работники предприятий пищевой промышленности;

- работники организаций, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов;

- работники медицинских организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности;

- работники коммунальной сферы, в том числе обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети.

7. Иммунизация против дизентерии Зонне (1 раз в год)

- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;

- работники предприятий пищевой промышленности;

- работники организаций, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов;

- работники медицинских организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности (их структурных подразделений) инфекционного профиля;

- работники организаций, занятые в сфере коммунального благоустройства.

8. Иммунизация против брюшного тифа

- работники коммунальной сферы: обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети;

- работники предприятий по санитарной очистке населённых мест, по сбору, транспортировке и утилизации бытовых отходов.